



FELV u koček je neléčitelné onemocnění. Ochraňte mazlíčka očkováním!

Leukémii u koček způsobují retroviry, které narušují imunitu kočky a podporují nádorové bujení. Větší výskyt nemoci je patrný u kocourů a u volně...

Jednou ze strašlivých nemocí koček je virová kočičí leukémie, zkráceně FELV. FELV u koček většinou končí smrtí, ale včasné rozpoznání diagnózy a moderní léčba může kočkám rozhodně prodloužit a zkvalitnit život. Jedinou účinnou prevencí proti této nemoci je očkování. Jak vlastně poznáme, že je naše kočka vážně nemocná a co pro nás znamená potvrzení této diagnózy?

Kočíí leukémie a inkubační doba

Leukémii u koček způsobují **retroviry, které narušují imunitu kočky** a podporují nádorové bujení. Větší výskyt nemoci je patrný u kocourů a u volně žijících koček, které často pak mohou způsobit přenos nemoci mezi další kočky, například v útulcích či jiných zařízeních pro kočky. **Nákaza se přenáší tělesnými sekrety**, tedy převážně slinami, krví, močí a výkaly, a to navzájem mezi kočkami.

Nemusíte se obávat, **přenos FELV z kočky na člověka není možný**. Kočky, které čekají koťata, pak automaticky **přenesou nákazu na svá mláďata skrze placentu i posléze kočičí mléko**. Mláďata nemocné kočky však obvykle umírají, anebo se rovnou narodí mrtvá. Pokud se kotě narodí v

pořádku, může se ještě nakazit z mléka od své matky.

Inkubační doba kočičí leukémie může být dlouhá i celé týdny. Zpočátku ještě třeba prvotní příznaky na kočce nepoznáme, ale ta už může přenášet nákazu dál mezi ostatní kočky.

Neléčená kočka, u níž není žádným způsobem podporován imunitní systém, obvykle umírá do dvou až tří let od nakažení. **Při správné léčbě a péči, však může mít kočička ještě dlouhý život,** i když je náchylná k zánětům a zdravotním problémům, které je potřeba ihned řešit s veterinářem. Pravidelné návštěvy zvěrolékaře jsou tak nezbytným základem.

Příznaky FELV u koček

Příznaky leukémie u koček mohou být plíživé a zpočátku nejasné. **Kočka celkově hubne a nežere, je unavená, mohou se jí zvětšovat mízní uzliny,** objevují se u ní záněty celého trávicího traktu počínaje dásněmi. Kočka **trpí průjmy, záněty kůže a zhoršuje se stav její srsti.** Může mít i další problémy včetně horečky. Postupně dochází k růstu nádorů, k rozpadu bílých krvinek a mnohým neurologickým potížím. Virus tak napadá celé tělo, dochází k úplné ztrátě imunity a k tvorbě sekundárních zánětů po celém organismu.

Prvotní příznaky kočičí leukémie obvykle vedou k návštěvě veterináře, který může kočce udělat **test na FELV.** Tento test rozpozná přítomnost viru kočičí leukémie v krvi. Test provedený u očkovaných koček proti FELV bývá negativní. Pokud je test u neočkované kočky zpočátku negativní a příznaky kočičí leukémie přetrvávají či se zhoršují, je vhodné tento test po pár týdnech opakovat.

Léčba leukémie u koček

Kočičí leukémie je vážná, nevyléčitelná a pro kočky bohužel smrtelná nemoc. **Kočky, které jsou pozitivní na FELV, je nutné izolovat od ostatních koček,** aby se nenakazily a dopřát jim plnohodnotný zbytek života s dobrou péčí, kvalitní výživou a důsledným **podporováním funkce imunitního systému.** Nakažené kočky se nesmí proti ničemu očkovat a také rozmnožovat. Je potřeba, aby nemocné kočky byly v klidu a v izolaci.

Na podporu imunity u kočky existuje celá řada přípravků a dietních opatření, určitě se můžete poradit se svým veterinářem. Rozhodně není od věci sáhnout pro pomoc také k alternativní medicíně, bylinkám a přírodním přípravkům. Na podporu imunity a **k léčbě leukémie u koček se doporučuje například také kurkuma.**

Očkování proti FELV u koček

Účinnou ochranu před leukémií u koček představuje vakcinace. Ta **probíhá po předchozím testování kočky na FELV.** Pokud je kočka pozitivní, nesmí se očkovat. Je to totiž zbytečné a její imunitní systém by to nezvládl. Došlo by k urychlení postupu nemoci a ke zhoršení jejího průběhu. Kočka, která má negativní testy na FELV, se může proti tomuto zhoubnému onemocnění naočkovat.

Existuje několik druhů vakcín proti virové leukémii koček. Váš veterinář vám poradí s vhodnou volbou vakcíny. **Po 3 - 4 týdnech od prvního očkování obvykle následuje ještě přeočkování.** Očkování kočky bez předchozího testování na FELV je nebezpečné a nedoporučuje se. Není žádný důvod k tomu, proč by kočka nemohla absolvovat předchozí test na FELV.

Alternativní léčba FELV u koček

Pokud by snad někdy vašeho mazlíčka tato nemoc zasáhla a měli byste zájem u své kočičky využít **možnosti podpory imunitního systému a léčby kočičí leukémie**, můžete také vyzkoušet různé přírodní či jiné podpůrné prostředky. Patří k nim například **kurkuma, enzymatická léčba, podávání přírodních antivirotik, především čínských bylinek a hub**. Léčba může být také zaměřena na podporu tvorby bílých krvinek. Pro kočku je zásadní, aby **nebyla vystavena žádnému stresu** a její majitel musí důsledně dodržovat veškeré kontroly a testování u veterináře.

V rámci prevence vzniku tohoto onemocnění se snažte kromě možnosti očkování svou **kočičku nevystavovat rizikům v podobě jejího kontaktu s cizími toulavými kočkami** a podobně. Věříme, že se vám tato nepříjemná nákaza vyhne velkým obloukem a vaše kočička bude spokojená a zdravá!