



FIP u koček aneb co dělat, když kočku trápí zánět pobřišnice

FIP u koček alias felinní infekční peritonitida je virové onemocnění, jehož původcem je koronavirus. Onemocnění postihuje hlavně koťata a mladé kočky...

FIP je zákeřné virové onemocnění, které může potrápit hlavně kočky se sníženou imunitou anebo kočky po operaci. Nejvíce náchylná jsou přitom koťata a mladé kočky do věku dvou let. Příznaky se liší podle toho, jakou formu onemocnění kočka má. V mnohých případech je však zánět pobřišnice velmi nebezpečný. Nakažená kočka bohužel nepřežije a proto je důležitá především prevence!

Zánět pobřišnice propuká hlavně u mladých koček

FIP u koček alias felinní infekční peritonitida je virové onemocnění, jehož původcem je koronavirus. Onemocnění postihuje hlavně **koťata a mladé kočky do věku dvou let**. Onemocnět však může i kočka starší deseti let, kočky se špatnou fyzickou kondicí nebo kočky postižené více infekcemi najednou.

Důvodem je jednak **slabý imunitní systém** nebo také **stres** či **léčba kortikoidy**. Kočka se nejčastěji nakazí **přímým kontaktem s přenašečem**. Většinou se jedná o infikované zvíře bez

rozvinutých klinických příznaků. Přenos onemocnění se ale může uskutečnit i **nepřímo**, a to třeba **prostřednictvím kočičí misky**.

Zánět pobřišnice - příznaky se liší podle formy onemocnění

Občas je velmi obtížné poznat, zda je kočka virem nakažená. Existují dvě formy onemocnění:

Efuzivní forma FIP (vlhká) - charakteristické je hromadění tekutiny v dutině hrudní a břišní, což zapříčiňuje, že kočka má **potíže s dýcháním**. Mezi příznaky patří **nechutenství, horečky, zvětšování břicha, zvracení či průjem**.

Neefuzivní forma FIP (suchá) - propuknutí je pomalejší, hromadění tekutiny je minimální. Typické jsou nervové příznaky jako je především **problém s chůzí, křeče, kývání hlavou do stran**. Můžete si také všimnout změny na očích - zánět spojivek, krvácení, přivírání víček.

FIP u koček a jeho léčba

Bohužel pro vás máme špatnou zprávu. Pokud se prokáže, že vaše kočka má opravdu FIP, pak se nedožije více než několika málo týdnů. Ovšem opět záleží na formě nemoci. Pokud váš mazlíček trpí **efuzivní formou**, pak může dospělá kočka přežít až **8 měsíců**. Pokud se potýká s **neefuzivní formou**, **kočky umírají většinou během pár týdnů**.

Léčba spočívá v podání imunosupresivních protizánětlivých látek a terapii jako je **podávání infuzí, umělá výživa a antibiotika**. Ovšem jedná se pouze o podpůrnou léčbu. Dochází jen k mírnění příznaků tohoto smrtelného onemocnění.

Pokud máte podezření, že vaše kočka je tímto virem nakažena, **ihned vyhledejte zvěrolékaře**. Sice kočku neuzdraví, ale v nejlepším případě vám pomůže prodloužit kočičce život.

Má moje kočka FIP?

Pokud necháte svojí kočku otestovat na přítomnost koronaviru a výsledek bude pozitivní, nepanikařte. V žádném případě to ještě neznamená spuštění FIP. **Onemocnění FIP vzniká jen u velmi malého procenta koček, které se s koronaviry v organismu potýkají**.

Zda se rozvine FIP pak záleží na imunitním systému a jeho **reakci na konoravidy**.

1. **Imunitní systém si s virem hravě poradí**, vymítí je a v těle zůstanou **protilátky**.
2. Pokud imunitní systém nepracuje zcela jak má, je možné že **v organismu virus zůstane**. Při stresu nebo při onemocnění kočky se pak může rozvinout do FIP.
3. Imunitní systém nezvládá obranu a většinou **neprodukuje žádné protilátky**. Rozvíjí se **vlhká forma FIP**.
4. Imunitní systém se snaží s virem vypořádat, pokud je však slabý, při boji **vir postupně přechází v onemocnění FIP**. Vzniká většinou **suchá forma FIP** a nástup je pomalý.

Existuje účinná ochrana proti FIP?

Stejně jako není k dispozici účinná léčba, nenajde se ani bezpečná ochrana. Můžete se snažit jen o

prevenci. A jak kočku ochránit? Především je nutné, abyste si vždy domů brali **kotě ze zdravého chovu** nebo podávali vždy jen **kvalitní krmivo**. Tak můžete podpořit zdraví kočky, kterou nebude trápit slabý imunitní systém.