



Škrkavka kočičí versus škrkavka psí: parazité, kteří mohou vaše mazlíčky velice potrápit. Odčervení je základ!

Červ zvaný Toxocara canis napadá psy a psovitě masožravce. Má bělavou barvu a je dlouhý 9 až 18 cm. Červi se vyskytují ve střevech psů, kde způsobují...

Malí a bílí červíci, kteří se vyskytují v trusu nebo zvracích koček a psů. Jedná se o parazity, které nechce u svých mazlíčků vidět žádný majitel. A to je škrkavka kočičí a škrkavka psí. Vyskytuje se hlavně u mláďat. Pokud nemoc včas neodhalíte, může mazlíčkům velice ublížit. Škrkavka způsobuje záněty střeva a larvy, které putují po celém těle, mohou napadnout i jiné orgány. Rádi vám poodhalíme, jaké jsou příznaky této nemoci a jak ji léčit.

Škrkavka psí - příznaky jsou průjmy a zvracení

Červ zvaný Toxocara canis napadá psy a psovitě masožravce. Má bělavou barvu a je dlouhý 9 až 18 cm. Červi se vyskytují ve střevech psů, kde způsobují záněty. Přenáší se často z fen na štěňata, a proto se doporučuje odčervení mladých od 2. či 3. týdne.

Mezi příznaky škrkavky u psa patří:

- průjmy
- nechutenství
- zvracení
- nafouklé břicho
- anemie
- matná srst
- křeče

Prevence a léčba škrkavky psí

Nejlepší ochranou je **odčervení**, které se nesmí podceňovat. Paraziti jsou totiž velmi odolní a mohou napadnout i odčervěného psa. Pokud je pes škrkavkou napaden, součástí léčby je také důkladná **dezinfekce pelechů** a veškeré textilie i podlah.

Pokud má pes výše uvedené příznaky nebo v jeho výkalech či zvracích naleznete červy, ihned ho vezměte k veterináři. Ten psa odčerví. Jen tak se můžete parazita zbavit. Ovšem pozor! Parazité se rádi vrací, proto nezapomínejte na to, že **odčervení musí být pravidelné**.



Škrkavka kočičí - příznaky jsou apatie nebo zánět plic

Škrkavka kočičí napadá **pouze kočku domácí** a také další kočkovité šelmy. Červy jsou trochu menší než u škrkavky psí, velcí jsou **do 7 cm**. Když se kočka nakazí, první vajíčka se začnou objevovat do 8 týdnů.

Infekce probíhá tak, že **kočka pozře zvíře, které má v těle již tuto infekci**. U koček se obvykle jedná o menší hlodavce nebo ptáky.

Příznaky škrkavky kočičí jsou:

- průjem
- chronický kašel
- zánět průdušek a plic
- střevní plynatost
- hubnutí
- apatie
- výhřez třetího víčka
- bolesti břicha

Prevence a léčba škrkavky kočičí

Stejně jako u psa je **prevencí odčervení kočky**. Proto si nikdy nebereme domů kočku, u které nevíme, zda byla odčervena. A především nesmíme podcenit návštěvu veterináře. První odčervení koťat by mělo proběhnout ve **věku 3 týdnů** a poté **pravidelně až do 4 měsíců**. Poté následuje odčervení **jednou za půl roku**.

Léčba taktéž spočívá v odčervení. Nikdy ale kočce nedávejte žádné léky bez toho, aniž byste se poradili s veterinářem.

Škrkavka psí versus škrkavka kočičí: rozdíl je v průběhu nemoci i přenosu

I kdy jsou si škrkavky psí a kočičí velice podobné, lze nalézt několik rozdílů.

Škrkavka kočičí

- Infekce u koťata je mnohem větší a **dramatičtější**.
- **Dospělé kočky mohou mít výrazné klinické příznaky** na rozdíl od dospělých psů.
- U koček se nemoc přenáší převážně **pozřením nakaženého zvířete**.
- Častěji se vyskytuje u **venkovních koček**.

Škrkavka psí

- U dospělého psa nemusí být příznaky patrné.
- Infekce se **přenáší hlavně přes placentu**.
- Může **napadnout i kočku**.

Mezi další nebezpečné parazity patří klíšťata i trudník

Existuje celá řada dalších parazitů, které mohou naše mazlíčky napadnout a způsobit jim nepříjemné problémy. Mezi ty nejčastější patří především:

Klíšťata

Zachytí se na zvíře a saje jeho krev. Mohou přenášet nebezpečné choroby, jako jsou **lymská borilióza a klíšťová encefalitida**. Účinné jsou antiparazitní kapsle, které vtíráme za krk mazlíčků nebo speciální obojky.

Trudník

Dokáže štěně ohrozit na životě. Způsobuje **zánět chlupových váčků, vypadávání chlupů i tvorba zarudlých míst**. Prevencí je jediné to, že si pejska koupíte od zdravých rodičů.

Blecha

Je sice velká asi 2 mm, psy a kočky dokáže ale velmi potrápit. Mazlíček se nadměrně škrábe. Ihned vydenzifikujte všechna místa, kde mazlík pobýval. Blech se zbavíte pomocí šamponů nebo sprejů.

Tasemnice

Potřebují **mezihostitele**, čímž jsou nejčastěji blechy, ve kterých se larvy tasemnice vyvíjí. Mezi projevy patří to, že si **zvíře tře konečník o zem**. Opatřením je odčervení i odblížení.